LUANDA
MEDICAL CENTER

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO INFORMATIVO LMC

**LUANDA MEDICAL CENTER
DEPARTAMENTO CLÍNICO
/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Dr. Justin Gavanescu
Dra. Vera Fontes
Dra. Ana Rita
Dr. Celestino Teixeira
Dr. Edivaldo Tchongo

ÍNDICE

INTRODUÇÃO _____ 03

PATOLOGIA DE DESTAQUE _____ 03

GRIPE _____ 04

CURIOSIDADES _____ 07

Vírus Subtype*	% Influenfluenza Plus**
A (H1N1)pdm09	0-10
A (H3)	11-20
A (H3)	21-30
B	menor de 30
	menor de 30
	Não aplicável

*Quando a amostra do influenza é maior que 20
 **Quando o número total de amostra testado é maior que 100

01. INTRODUÇÃO

Monitorizar e Avaliar a Vigilância e Resposta

Os processos acima referidos estão directamente relacionados a melhoria dos Sistemas de Vigilância e Resposta; a Monitorização consiste no acompanhamento rotineiro e contínuo das suas actividades e a Avaliação permite-nos verificar se seus Objectivos, Metas e Indicadores foram atingidos.

Um dos elementos fundamentais em todo este processo são os Recursos Humanos (RH) que a todos os níveis do Sistema Nacional de Saúde são responsáveis pela recolha, processamento e análise dos resultados tendo em conta a monitorização da chegada oportuna e completude dos relatórios, a avaliação da qualidade da notificação imediata, semanal e mensal. Nesta busca constante do conhecimento do comportamento das doenças e eventos adversos a saúde ao nível dos Sistemas de vigilância, são definidos Indicadores e metas como referimos anteriormente; os Indicadores servem para medir o grau de cumprimento e a extensão das realizações e progressos alcançados na implementação de um Programa e/ou Actividades e as Metas são objectivos que o Sistema almeja alcançar.

Assim os 5 indicadores essenciais da Vigilância de Doenças e Resposta (VID-R) para as Unidades de saúde são;

Proporção de relatórios completos e apresentados a tempo ao município;

Proporção de doenças prioritárias com gráfico linear actualizado;

Proporção de casos de doenças notificadas ao município usando o formulário respectivo;

Proporção de Surtos suspeitos de potencial epidémico, notificados ao município 2 dias após ultrapassado limiar epidémico e Taxa de Letalidade e de Ataque para cada doença de potencial epidémico (Manual VID-R, MINSÁ, 2010; OMS,2010).

2. PATOLOGIA DE DESTAQUE

Nesta rubrica vamos falar da Gripe no contexto da Pandemia **COVID-19**, devido a sua importância (Incidência) no panorama epidemiológico nacional.

3. GRIPE

Segundo a OMS, Gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório; que se pode apresentar sob a forma de Síndrome Gripal (SG) e/ou de Síndrome Respiratório Agudo Grave (SRAG). Relatos históricos indicam sua existência desde o tempo de Hipócrates (412.a.C) onde foram descritos Síndromes de Gripe Influenza semelhantes aos de hoje, a Gripe espanhola é destaque cuja Pandemia foi descrita há mais de 100 anos (1918-1920) com mais de 500 milhões de infectados e mais de 40 milhões de mortes, sendo considerada a Mãe das Pandemias por ser a primeira a atingir praticamente todos os continentes.

É considerado Síndrome Gripal (SG), quando uma pessoa apresenta febre igual ou superior a 38 °C e tosse com início nos últimos 10 dias e Quando o paciente requer hospitalização, a doença é classificada como Síndrome Respiratório Agudo Grave (SRAG). As SG são causadas principalmente pelos Vírus Influenza A, B e C, uma espécie da família Orthomyxoviridae; e os Vírus SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 da família Coronaviridae são causa de SRAG.

O período de incubação que aquele que vai desde a exposição aos Vírus até ao início dos sintomas, tem uma duração de 2 - 7 dias para a SG podendo chegar à 10 dias para SRAG e a transmissibilidade é cada vez mais inter-humana por gotículas eliminadas ao tossir, espirrar e falar ocorrendo desde 24 horas antes até 7 dias (adultos) a 14 dias (crianças) após o início da sintomatologia.

Do ponto de vista epidemiológico os SG/SRAG ocorrem durante todo o ano, mais frequentemente no outono e inverno (baixas temperaturas), podendo afetar 3-5% para população que de acordo com dados da OMS em 2022 ao nível

do mundo se estime 1 Bilião de casos de Influenza, 3 a 5 Milhões de casos graves e 290-650 Mil mortes; relativamente a COVID-19 que é uma SRAG, números são alarmantes com mais de 630 Milhões de Casos e acima de 6,5 Milhões de Mortes ao nível do Mundo até a data da elaboração deste Boletim.

Fig 1. Estações de Gripe: Novembro-Abril (azul), Abril-Novembro (vermelho) e durante todo o ano (amarelo)

Clinicamente o SG se manifesta por febre alta ($\geq 37,8^{\circ}\text{C}$); Sinais/sintomas respiratórios (tosse, dor na garganta, rinorreia, ronquidão, dispneia) e Sinais/sintomas sistêmicos (mal estar, fadiga, calafrios, mialgias, artralgias).

Em resumo Febre associada a 1 Sinal/sintoma respiratório e 1 Sinal/sintoma sistêmico.

Sempre que estivermos a falar em SG, devemos pensar em 3 aspectos fundamentais nomeadamente os grupos de risco, as complicações e nos casos mais graves que necessitam de tratamento em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Grupos de risco:

Adultos ≥ 60 anos, Crianças $\leq 2-5$ anos, Gestantes e Puérperas (até 2 semanas pós parto/aborto), Comorbidades como as do fórum Respiratório, Cardíacas (Excepto Hipertensão arterial), Renais, Hepáticas, Hematológicas(Drepanocitose), Imunossupressão (Tratamento, SIDA), Distúrbios metabólicos (Diabetes Mellitus e Obesidade $\text{IMC} \geq 35-40 \text{ kg/m}^2$). O diagnóstico do SG e SRAG é essencialmente clínico tendo em conta a sintomatologia, se paciente faz parte do grupo de risco e/ou apresente algum sinal de alerta de gravidade. São tidas em consideração as alterações laboratoriais como diminuição dos Glóbulos brancos, Plaquetas, aumento das Transaminases/Creatinina e muito mais importante os marcadores de mau prognóstico como aumento da Creatinofosfokinase (CPK), D-Dímero e Troponina; outro aspecto a considerar são as alterações no Raio X e Tomografia com lesões de imagem em vidro fosco que podem evoluir para consolidação com predomínio de opacidades e redução da observação dos vasos sanguíneos. No entanto os testes rápidos e moleculares dão-nos o diagnóstico etiológico (causa) de certeza. O tratamento consiste em cuidados gerais (Higiene e evitar a transmissão); repouso (7 dias

após início dos sintomas); administrar analgésicos/antipiréticos (diminuir a dor/febre) e tratamento antiviral (Oseltamivir/Zanamivir) se paciente com SG apresenta desconforto respiratório, pertence ao grupo de risco e/ou apresenta sinais de alerta para a gravidade. A prevenção consiste basicamente em implementar medidas gerais para impedir a propagação do Vírus, como:

Molhe bem as mãos água corrente

Molhe bem as mãos água corrente

esfregue as costas de ambas as mãos

esfregue bem as palmas de ambas as mãos

Lave os pulsos até meio braço

esfregue cuidadosamente as unhas de cada mão

Lave os polegares e as zonas entre os dedos

Esfregue também as costas dos dedos

Por fim desinfete as mãos com álcool gel

- Lavar (higienizar) com frequência as mãos
- Usar lenço descartável para higiene nasal
- Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
- Higienizar (lavar) as mãos após tossir ou espirrar
- Evitar tocar superfícies Importante referir também que a vacinação contra os Vírus causadores da SG e SRAG

PERCENTAGEM DE CASOS/EVENTOS DE NOTIFICAÇÃO PRIORITÁRIA, LMC, AGO OUT 2022

Importante referir também que a vacinação contra os Vírus causadores da SG e SRAG como pessoas pertencentes aos grupos de risco é fundamental (OMS,2021-2022; Brenda Tesini,2022; CDC,2019; Christiane Sousa,2008; BioEnfermagem.com,2009).

Covid-19

Dada a sua importância no panorama epidemiológico do país, esta doença continua a ser de notificação imediata, com o número de casos a se manter em níveis baixos; no entanto no final deste período de reporte e coincidindo com a nova onda de infecções na Europa, constatamos um aumento de casos de Síndrome gripal, e muitos dos casos com teste positivo e história de viagem. Foram diagnosticados de acordo com o gráfico abaixo, 290 casos novos que correspondeu a uma positividade de 5,84%. Entre os casos referidos o sexo masculino foi o que apresentou maior percentagem (51,38%) e a faixa etária mais acometida foi a dos 30 - 39 anos com 64 casos (29,2%).

Dengue

Continua a ser a segunda causa de morbilidade ao nível da LMC, com 584 casos (23,23%), que atingiu maioritariamente pacientes da faixa etária dos 25-49 anos (gráfico abaixo).

Síndrome Gripal

Estas doenças respiratórias sazonais representaram a terceira causa de morbilidade na LMC entre as Doenças de Notificação Prioritária, com 582 casos (23,15%), sendo a faixa etária dos 25-49 a mais cometida (gráfico abaixo).

Hipertensão Arterial

(HTA) Foi entre as doenças crónicas não transmissíveis a principal causa de morbilidade, correspondendo a quarta no geral com 512 casos (20,37%). A semelhança das anteriores, a faixa etária mais acometida foi também a dos 25-49 anos (gráfico abaixo).

Infecção Unrinária

Neste período esta patologia registou um aumento de casos e representou a quinta causa de morbimortalidade com 188 casos (7,48%), e atingiu maioritariamente a faixa etária dos 25-49 anos (gráfico abaixo). Conjuntivite A semelhança da patologia anterior, neste período esta patologia também registou um aumento do número de casos e representou a sexta maior causa de morbilidade com 144 casos (5,73%), sendo a faixa de 1-4 anos a mais atingida.

Hepatite

Esta patologia correspondeu a sétima, entre as principais causas de morbilidade com 140 casos (5,57%). A mesma atingiu maioritariamente adultos jovens na faixa etária dos 25-49 anos e quanto ao sexo (gráfico abaixo).

Malária

Esta patologia correspondeu a oitava, entre as principais causas de morbilidade com 126 casos (5,17%). A mesma atingiu maioritariamente adultos jovens na faixa etária dos 25-49 anos e quanto ao sexo (gráfico abaixo).

Diabetes Mellitus

(DM) Entre as principais causas de morbilidade ao nível da LMC, ocupa a nona posição e a segunda entre as doenças crónicas não transmissíveis, com 105 casos (4,18%); no entanto a faixa etária mais acometida foi a dos 50 e + anos (gráfico abaixo).

Outras patologias

Por ordem decrescente, as menos frequentes com relevância foram a Febre tifoide com 37 casos (1,47%), a varicela com 32 casos (1,27%) e Febre tifoide com 40 casos (1,42%) e Infecções Respiratórias Agudas Graves em > 5 anos com 29 casos (1,15%). Nestas patologias a faixa etária mais acometida foi dos 25-49 (gráfico abaixo).

PERCENTAGEM DE CASOS/EVENTO DE NOTIFICAÇÃO PRIORITÁRIA LMC, AGO-OUT 2022

CURIOSIDADES

- Cientistas apontam que pandemias da doença ocorram entre duas ou três vezes a cada século.
- Pessoas jovens e saudáveis são as mais suscetíveis pois sistema imunológico reage de forma exagerada.
- Os vírus da doença sofrem mais mutações em um dia que os seres humanos são capazes de mudar em milhões de anos
- É verdade que uma Gripe possa durar mais de 1 semana, sempre que haja complicações.
- É mito que espirrar constante é sinal de Gripe e que a vitamina C a previne (Google, 2022).

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO INFORMATIVO LMC

LUANDA
MEDICAL CENTER